

# ÇELTİK İLAÇLAMA PROGRAMI

## ZARARLILAR



Çeltikte Tepe Göz
*(Triops concriformis)*

| İLAÇ ADI | DOZU | MÜCADELE ŞEKLİ VE ZAMANI |
|---|---|---|
| **HEKTHİON 20 EM**<br>(190 gr/lt Malathion) | 250 cc / da | Mayıs ayında tavalar içerisinde su birikintilerine toplanan zararlılara karşı ilaçlama yapılır. |

## HASTALIKLAR



Çeltik Yanıklık Hastalığı
*(Pyricularia oryzae)*

| | | |
|---|---|---|
| **PİLBEN 50 WP**<br>(%50 Benomyl)<br>**HEKVİSTİN 50 WP**<br>(%50 Carbendazim)<br>**TAKİSTİN 50 WP**<br>(%50 Carbendazim) | 60 gr / 100 lt su<br><br>150 gr / da<br><br>150 gr / da | Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde uygulanmaktadır. Hastalık görüldüğü zaman ilaçlama yapılır. |

## NEMATODLAR



Çeltikte Beyaz Uç Nematodu
*(Aphelenchides besseyi)*

| | | |
|---|---|---|
| **METABROM**<br>(%98 Methyl Bromide,<br>%2 Chloropicrin) | 25 gr / 1 $m^3$ hacme | 15-20 cm derinlikteki toprağın ısısı 8 °C'nin üstünde ve toprak iyi işlenmiş ve keseksiz olduğunda ilaçlama yapılır. |

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**
**GENEL MÜDÜRLÜK**
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 700. Sok. 41480 Gebze/KOCAELİ
Tel : (0262) 751 14 12 (Pbx) Fax : (0262) 751 14 22 e-mail: info@hektas.com
http://www.hektas.com

Certified ISO 9001 by
BVQI
No:122075
RESPONSIBLE CARE
ÜÇLÜ SORUMLULUK

# ÇELTİK İLAÇLAMA PROGRAMI

## YABANCIOT



Darıcan *(Echinochloa crus-galli)*



Yabani Darı *(Panicum pupurecens)*



Kızotu *(Cyperus difformis)*



Kındıra *(Scirpus mucronatus)*



Dip otu *(Potamogeton pectinatus)*

| İLAÇ ADI | DOZU | MÜCADELE ŞEKLİ VE ZAMANI |
|---|---|---|
| **ORLATE EC**<br>(720 gr/lt Molinate) | 500-600 cc / da | Ekim öncesi ve sonrası kullanılabilir. |
| **GULLIVER**<br>(%50 Azimsulfuron) | 3 gr / da + 20 cc / da<br>Trend 90 | Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak ya da 5-10 cm boyda) kullanılmalıdır. |
| **SINDAX 10 WP**<br>(%8,25 Bensulfuron methyl<br>+<br>%1,75 Metsulfuron methyl) | 15 gr / da<br>Alibeyköy otu 20 gr/da | Çeltik 3 yapraklı, yabancıotlar 2-4 yaprak ya da 5-10 cm boyda iken ilaçlama yapılır. |
| **HEPANİL 36 EC**<br>(360 gr/lt Propanil) | 900-1500 cc / da | Çıkış sonrası kullanılır. Çeltik 2-5 yapraklı iken (900 cc / da) veya kardeşlenme (1500 cc / da) başlangıcında ilaçlama yapılır. İlaçlamalar çeltik ekiminden itibaren 40-45 gün içinde yapılmalıdır. |

**Bitki Gelişim Düzenleyicileri, Kimyevi Gübre ve Organik Toprak Düzenleyicileri**

BIOZYME TF, MICROPLEX SUPER, MICROSET SUPER, SUPA BOR, SUPA ZINC, CROPTEC 20-20-20




Kurbağa Kaşığı *(Alisma sp.)*



Dip otu *(Potamogeton pectinatus)*



Alibeyköy otu *(Leersia oryzoides)*



Dip otu *(Potamogeton pectinatus)*



Darıcan *(Echinochloa crus-galli)*