MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU
(*Spodoptera exiqua*)


Çizgili Yaprak Kurdu Ergini


Yumurtaları



Larvaları

Tanımı ve Yaşayışı

- Kelebeğin kanat açıklığı 2-3 cm arasındadır.
- Ön kanatlar koyu kahverengiden açık gri renge kadar değişiklik gösterir. Bu kanatların orta bölümlerinde açık renkli iki leke vardır. Arka kanatlar beyazımtrak, damarları ise koyu renklidir.
- Kanatların etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir.
- Yumurtalar beyaz renkli olup, yaklaşık olarak 0.4 mm çapındadırlar.
- Kümeler halinde bırakılan yumurtalar tüylerle örtülüdür.
- Olgun larvalar 3 cm kadar boy alırlar. Larvalar genellikle yeşilimsi veya kahverengimsi renktedirler. Yanlarında vücut boyunca uzanan bantlar bulunur.
- Kelebekler nisan sonlarına doğru görülmeye başlarlar. Geceleri uçuşurlar.
- Yumurtalarını yapraklara kümeler halinde koyarlar.
- Bir dişi 1700 kadar yumurta bırakabilir.
- Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 3-6 gün sonra açılır.
- Yılda 3-5 döl verirler.

Zarar Şekli

- Gruplar halinde yasayan genç larvalar yaprak ve tomurcukların dış kısımlarını yiyerek zararlı olurlar.
- Larvalar geliştikçe yaprak damar aralarını yiyerek yalnız yaprak damarlarını bırakırlar.
- İyice büyüyen larvalar ise yaprağın tamamını yiyip bitirirler.
- Boylanan bitkilerde toprak üzerinde bulunan yan köklerle de beslenirler.
- Zarar derecesi % 100'e ulaşabilir.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Zararlı olduğu bitkiler arasında pamuk, mısır, ayçiçeği, tütün, sebzeler ve bunlara benzer daha bir çok bitki sayılabilir
- Ayrıca orman ve meyve ağaçlarında da zarar yapabilmektedirler.

Mücadele Yöntemleri

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.
-