MISIRDA BOZKURT

(*Agrotis ipsilon* ve *Agrotis segetum*)



Bozkurt erginleri



Bozkurt larvaları



Mısırda bozkurt zararı

Tanımı ve Yaşayışı

- Erginlerde baş ve göğüs kahverengimsi tüylerle örtülüdür. Kanat açıklığı 4-5 cm olup ön kanatlar arka kanatlara göre daha koyu renklidir. Ön kanatlar genellikle kahverengimsi üzerlerinde biri böbrek, öteki yuvarlak iki leke vardır.
- Olgun larva boyu 4-5 cm dolayındadır. Baş genellikle kestane renginde vücut ise gri veya esmer renklidir. Üzerlerinde uzunlamasına bantlar vardır. Rahatsız edilince kıvrılıp halka biçimini almaları tipik özelliklerindendir.
- Bozkurt erginleri genellikle nisan ayı başlarında görülmeye başlar.
- Kelebekler geceleri faaliyet gösterip çıkışlarından 2-3 gün sonra yumurtalarını tek tek veya küçük gruplar halinde bitkilerin gövdeleri üzerine, yaprakların alt yüzeylerine veya toprak yüzeyine bırakırlar.
- Larvalar çoğunlukla gece faaliyet gösterirler. Gündüzleri, kestikleri bitkinin yanında toprak içinde gizlenirler.
- Yılda 4-5 döl verirler.

Zarar Şekli

- Larvalar genellikle genç mısır bitkilerinin kök boğazını toprak yüzeyine yakın bölümünden keserek zararlı olurlar.
- Bazen tarlanın yeniden ekilmesi gerekebilir.
- Yılda 4-5 döl vermektedir.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Çok sayıda yabani ve kültür bitkileri konukçusu durumundadır.
- Bunlar arasında mısır, buğday, ayçiçeği, tütün, pamuk, keten, sebzeler, şeker pancarı, süs bitkileri yer almaktadır.

Mücadele Yöntemleri

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.