MISIR MAYMUNCUĞU
(*Tanymecus dilatticollis*)


Mısır Maymuncuğu ergini

Tanımı ve Yaşayışı

- Erginleri oval biçimde ve boyları 1 cm'e yakındır. Renkleri parlak siyah olmakla birlikte, üzeri kirli sarı, beyaz renkte pul ve tüylerle kaplı olduğundan, gri veya toprak rengi görünümündedir.
- Larvaları köklerle beslenmektedir ama zararı önemli değildir.
- Larvaları sarımsı beyaz renkli, kıvrık biçimde ve olgun larvalar 1.0 cm boyundadır.
- Erginler, mart başlarından itibaren görülürler.
- Yumurta bırakma nisan başından temmuz başına kadar sürmektedir. Yumurta bırakmanın en yoğun olduğu zaman mayısın ikinci yarısı ile haziranın ilk yarısı arasındadır.
- Yeni nesil erginler, çoğunlukla eylül ayından itibaren toprak içinde görülmekte ve kışı bulundukları yuvalarında geçirmektedirler.


Zarar şekli

Zarar Şekli

- Erginler toprak yüzüne yeni çıkan mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde yiyerek ve büyüme konilerini keserek önemli zararlara neden olurlar.
- Zarar mısırın 2-3 yapraklı dönemine kadar bu zarar önemli ölçüde sürmektedir.
- Mısır fidelerinin gelişmesi ilerledikçe zarar azalmakta ve önemini yitirmektedir.
- Zararlının yoğun olduğu tarlalarda, gerekli önlemler zamanında alınmazsa, tarlanın yeniden ekilmesi veya boş kalması söz konusu olabilir.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Bazen çimlenmekte olan mısır tohumlarında da zararlı olmaktadır. Mısır dışında ayçiçeğinde de önemli zararlara neden olmaktadır.
- Bunlardan başka şeker pancarı, buğday, sebze, yabancı ot ve daha birçok bitkide beslenmektedir.

Mücadele Yöntemleri

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.