ANTEPFISTIĞINDA KARA ZENK HASTALIĞI

(*Septoria pistacina*)



Hastalığın meyvelerdeki görünümü



Yapraktaki belirtisi

Hastalık belirtisi:

•Hastalık yapraklarda ve kısmen de meyve dış kabuğunda siyah lekeler şeklinde görülür. Karazenk lekeleri zamanla tüm yaprak yüzeyini kaplayabilir ve yaprakların kurumalarına, zamanından önce dökülmelerine neden olur. Mevsim şartları hastalık için uygun giderse septoria lekeleri zamanla meyvelerde de görülür.

•Yaprakları zarar gören ağaçlar, zayıf düşer, meyve içleri gelişemez, karagözler dökülür, dolayısıyla gelecek yılın ürünü azalır. Hastalığın şiddetli olarak görüldüğü yıllarda ağaçlar birkaç yıl ürün vermez, hastalığın şiddetine bağlı olarak üründe %3 ile %100 e varan kayıplar olur.

•İlk bulaşmalar nisan sonlarına doğru, çiçeklerin döllenmesinden sonra meyveler buğday tanesi büyüklüğüne geldiğinde başlar. Yaklaşık 19 gün sonra yapraklarda ilk hastalık lekeleri oluşur. Yapraktan yaprağa ve diğer ağaçlardaki yapraklara rüzgar, yağmur ve böceklerle taşınan hastalık etmeni yeni bulaşmalar yapar. Bu şekilde (hastalık için uygun şartlar altında) mevsim boyunca 19-30 gün ara ile 3 kez yeni bulaşmalar olur.

Hastalığın görüldüğü bitkiler:

Antep fıstığı

Mücadele:

Kültürel Önlemler:

•Sonbaharda hasattan sonra yere dökülen yapraklar toplanıp yakılmalı yada derince toprağa gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele:

•Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.