

BAHÇE BİTKİLERİNİN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bahçe Bitkileri Yetiştirme I

Prof.Dr.Ş.Şebnem ELLİALTIOĞLU

- Çiçek ve tohumlar, meyve oluşumu ve gelişimi ile generatif üretim için gerekli organlardır. Bu nedenle meyve ve tohumların ve bunların orijini olan çiçeklerin, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir yeri vardır.



Patlıcan çiçeği



Domates çiçeği


ÇİÇEĞİN ORİJİNİ VE YAPISI

- A. ÇİÇEĞİN ORİJİNİ

Çiçekler generatif organlardır ve esas görevleri bitkilerin neslini devam ettirmektir. Çiçekli bitkiler yaşamlarının başlangıcında vegetatif olarak gelişirler ve bir döneminde de üretken döneme gelirler. Kalıtsal yapı ve çevre koşulları, bitkinin generatif olgunluğa gelme süresini belirler.


- İlk çiçeklerin oluşumu ve generatif olgunluğa geçiş bir veya iki yıllık otsu bitkilerde (domates, lahana, çilek vb.) 1. veya 2. yılda gerçekleşirken; bu süre meyve ağaçları gibi çok yıllık ve odunsu bitkilerde 2. ile 7. yıl (Antep fıstığı) arasında değişir. Verimsiz geçen bu süreye "gençlik kısırlığı" adı verilmektedir.

Ayrım safhaları



- Generatif olgunluğa gelen bitkilerde vegetatif tomurcuklardaki meristemler, çiçek meristemlerine dönüşürler. Morfolojik olarak gözlenemeyen, fakat kuramsal olarak kabul edilen; fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin olduğu bu safhaya **fizyolojik ayrım safhası** denir.
- Bunun ardından meristemde morfolojik değişimler başlar. İlk görülebilir farklılaşma büyüme konisinin daha geniş ve düz bir şekil almasıdır.Morfolojik yapıda meydana gelen bu ilk farklılaşma safhasına **morfolojik ayrım safhası** denir.

- Morfolojik ayrım safhasından sonra çiçek tablasını oluşturacak olan büyüme konisi üzerinde, dıştan merkeze doğru sırasıyla çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ taslakları oluşmaktadır.



Çiçek tomurcuklarının yapıları ve oluştukları yerler, türlere ve çeşitlere göre değişmektedir.

- Bazı tomurcuklarda sadece çiçekler bulunur. Bu tomurcuklara **‘basit tomurcuk’** denir. Kayısı, şeftali ve bademde bir tomurcuktan sadece bir çiçek çıkar; erik, kiraz ve vişnede ise birden fazla (2-4 adet) çiçek çıkar.


Şeftali


Badem



Vişne



Kiraz



Prunus sargentii

- Bazı çiçek tomurcuklarında çiçekli sürgünler oluşmaktadır. Bu tomurcuklara da ‘karışık tomurcuk’ denilmektedir. Çiçek ve yaprakların bir arada olduğu bu tomurcuklarda, ayvada olduğu gibi bir tek çiçek, ya da elma, armut ve kivide olduğu gibi 5-8 çiçek bulunmaktadır.


Ayva çiçeği tomurcuk iken


Ayva çiçeği


Armut


Elma


Kivi

Asmalarda tomurcuk yapıları meyvelerden farklıdır. Bunlarda gözler vardır.

- Asmalarda gözler bulundukları yere ve sürme zamanlarına göre sınıflandırıldığında, ‘aktif tomurcuklar’, ‘kışlık gözler’ ve ‘adventif gözler’ olarak isim alırlar.



- Aktif tomurcuklar; yazlık sürgünlerin üzerinde, yaprak koltuklarında, kışlık gözün yanında bulunurlar ve oluştukları aynı vegetasyon döneminde sürerler. Bu sürgüne “koltuk sürgünü”, üzerinde oluşan salkımlara da “neferiye” adı verilir.



Kışlık gözler; oluştukları yıl sürmeyip, kışı dinlenme halinde geçirdikten sonra ertesi vegetasyon döneminde süren gözlerdir. Verimli olan bu gözler, salkım ve yaprak taslaklarını içerir.Kışlık gözlerin sürmesiyle oluşan sürgünlere “yazlık sürgün” adı verilir.









2005
Mark
Longstroth








- **Adventif gözler**; omcanın gövde ve yaşlı kollarında bulunan ve varlıkları ancak sürdükleri zaman anlaşılabilen gözlerdir. Bu gözlerin sürmesiyle oluşan sürgünlere “filiz”, “obur” adı verilir. Toprak altındaki gözlerden sürenlere ise “piç” denir.





- B. ÇİÇEĞİN YAPISI


Çiçekler, çiçek organlarının oluşturduğu bir eksene sahiptirler. Buna çiçek sapı (**pedicel**) denir. Çiçek sapının ucunda çiçek tablası (**receptacle**) yer alır. Çiçek tablası üzerinde dıştan içe doğru çanak yapraklar, taç yapraklalr, erkek organlar ve dişi organ(-lar) bulunur.


Tam bir çiçekte çiçek organları




STAMEN
ANTHER
FILAMENT
POLLEN TUBE
STIGMA
STYLE
PISTIL
OVARY
SEPAL
PETAL
OVULE
RECEPTACLE



style
stigma
petal
stamen
anther
filament
calyx
pistil
ovary
seeds
stem


Stamen
Carpel
Stigma
Anther
Style
Filament
Ovary
Petal
Ovule
Sepal



- Çiçek tablasının en dış halkasında bulunan, genellikle küçük, yeşil renkli, yaprak benzeri yapılara **çanak yaprak** (**sepal**) denir. Çanak halkası bulunmayan çiçeklere asepal denir (lale gibi).









- Bahçe bitkilerinin çoğunda taç yapraklar, güzel renkleri ve şekilleri, bazen de kokuları ile arıları ve bazı böcekleri çeken kısımlarıdır.


- Taç yapraklar (corolla), genellikle çiçeklenme sonunda dökülür. Asma çiçeklerinde taç yapraklar, açılmamış çiçeklerde sıkı bir şekilde birleşerek çiçeği bir külah gibi sararlar. Çiçek açılınca corolla, çiçek tablasına bağlandığı yerden ayrılır ve erkek organların baskısıyla çiçek üzerinden atılır.







Vine. (*Vitis vinifera*.)



Vine.
Young flower (mag.).



Vine.
Vertical section of flower (mag.).



Vine. Diagram.




Vine. Fruit.



Vine.
Transverse section of seed, showing the ruminate albumen (mag.).



Vine.
Flower without corolla (mag.).



Vine.
Seed, entire and cut vertically (mag.).


- Bazı çiçeklerde, fındık, ceviz, Antep fıstığı dişi çiçeklerinde olduğu gibi, taç yapraklar hiç bulunmaz.
- Korollası olmayan çiçeklere **apetal** denir.


Fındık dişi çiçeği


Antep fıstığında dişi çiçekler


Erkek organ (stamen)











- Erkek eşey hücrelerini (**polen**) üretmekle görevlidir. Başçık (**anter**) ve bunu çiçek tablasına bağlayan sapçıktan (**filament**) oluşmuştur. Başçıklar ikişer adet çiçek tozu kesesi (**loculus**) içeren iki **teka**'dan oluşmuştur.




Anther
Anther sac
with pollen
Filament


5


©CMM, 1996. Enhanced by George Musil







6-7 adet anterleri olan değişik biber çiçekleri



Elma çiçeği




- Anterlerin şekli, büyüklüğü, sayısı ve rengi bitki türlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin elmada 15-50, biberde 6-7 adettir. Çoğunlukla sarı renkli, fakat bazı türlerde kırmızı veya mor renklidir.



- Böceklerle tozlanan çiçeklerde, genellikle erkek organlarla taç yapraklar arasında balözü (**nektar**) çıkaran bezler vardır.









Dişi organ (Pistil)



- Çiçeğin en önemli organıdır. Çünkü ancak dişi organı olan bir çiçekten meyve veya tohum alınabilir.
- Dişi organ tepecik (**stigma**), dişicik borusu (**style**) ve yumurtalık (**ovary**) olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur. Stigma, dişicik borusunun az veya çok gelişmiş ve pürüzlü bir yapıya sahip en uç kısmıdır. Rüzgarlarla tozlanan türlerde stigma çok parçalı veya geniştir. Böceklerle tozlananlarda ise stigma yapışkan ve tüylü yapıda olabilir.



Stigma




Ahududu çiçeği, (döllenmeden hemen sonraki günler)





Çiçek çiçeğinin uzunlamasına kesiti

Dişi organın yapısı



Çiçeklerde Cinsiyet

- Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır. Tozlanma ve döllenme meydana gelince meyve ve tohum oluştururlar.
- Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organların hepsine sahip çiçeklere ‘tam’ veya ‘eksiksiz çiçek’; bunlardan biri olmasa bile ‘eksik çiçek’ denir.Yalnız erkek veya dişi organı olan çiçeklere ‘kusurlu’ çiçekler denir.



Patlıcan çiçeği



Şeftali çiçeği




Citrus çiçekleri

- Hem erkek hem de dişi organı kusursuz çiçeklere **erdişi, erselik (hermaphrodite) çiçekler** denir. Domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ile elma, armut, erik, şeftali, portakal gibi meyve türlerinde erselik çiçekler bulunur.

- Bazı erselik çiçeklerde dişi veya erkek organ fonksiyonel değildir. Erkek organı fonksiyonel olmayan çiçeklere **“morfolojik erdişi fizyolojik dişi”** denir. Kültür asmalarında bu yapıya rastlanabilir. Bu çiçek tipinde filamentler aşağıya doğru kıvrıktır. Örn: Çavuş, Karagevrek, Hönüsü, Tahannebi üzüm çeşitleri.

- Eşey organlarından sadece birini bulunduran tek cinsli çiçekler eğer aynı bitki üzerinde bulunuyorsa, yani bir bitkinin üzerinde farklı yerlerde dişi veya erkek çiçekler yer alıyorsa bu bitkilere **monoik (tek evcikli) bitkiler** denir. Sebzelerden Cucurbitaceae familyası üyelerinde (kabak, kavun, karpuz, hıyar); meyvelerden de fındık, ceviz, kestane ve dut monoik çiçek yapısına sahiptir.




Dişi kabak çiçeği






Erkek kabak çiçeği



Monoik bir bitki: Kornişon hıyarı



Kavunda çiçek tipleri: hermafrodit, erkek, dişi çiçek (soldan sağa)


male flowers
female flowers
Begonia
A monoecious plant



Fındıkta erkek ve dişi çiçekler



Cevizde erkek çiçekler (üstte), dişi çiçekler (altta)




- Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı bitkilerde bulunuyorsa bu bitkilere de **dioik (iki evcikli) bitkiler** denir. Antepfıstığı, incir, hurma, papaya, kivi, ıspanak, kuşkonmaz dioik bitkilerdir.



Erkek (solda) ve dişi (sağda) çiçek salkımları (Antep fıstığı)

TOZLANMA

Döllenmenin ilk koşulu tozlanmanın olmasıdır. Erkek organ başçığında (anter) olgunlaşan çiçek tozlarının, dişicik tepesi (stigma) üzerine taşınmasına tozlanma denir.



Rüzgarla Tozlanma



Böcekle Tozlanma

Böceklerle tozlanma

Böceklerle tozlanan bitkilere ‘entomofil (entomophyl) bitkiler’ denir




http://foto.teztasarim.com


http://foto.teztasarim.com

Polenlerle kaplanmış bir stigmanın
elektron mikroskobundaki görüntüsü





Arının vücuduna yapışmış polen taneleri



Bu anter ormanının içine hangi arı girse,
tamamen polenle kaplanmaz mı? ☺

- Domates, biber, elma ve şeftali gibi böceklerle tozlanan (entomofil) bitkilerde erselik çiçek yapısı görülür. Bunların taç yaprakları böcekleri cezbetmek amacıyla güzel kokulu, gösterişlidir ve bir çoğunda nektar salgılayan bezler vardır.

- Stigmaları ve anterleri küçük, çiçek tozları rüzgarla döllenene nazaran az, iri ve yapışkandır.

- Böceklerle tozlanmada en önemli canlı türü arılardır, daha sonra ise kelebekler ve diğer böcekler gelir.

Böceklerle tozlanan meyve türleri

ELMA 

VİŞNE 

NAR 

ARMUT 

AYVA 

BADEM 

ERİK 

İNCİR 

ŞEFTALİ 

KİRAZ 

Anemofil Bitkiler



- Rüzgarla tozlanan bitkilere ‘anemofil (anemophyl) bitkiler’ denir.






- Rüzgarla tozlanan bitkiler genellikle bir cinsli çiçek bulundurur. Fındık, Ceviz, Dut, Kestane (tek evcikli=monoik) ile Hurma ve Antep fıstığı (iki evcikli=dioik türler) buna örnektir.

- Bu bitkilerin çiçekleri gösterişli değildir, taç yaprakları ya hiç yoktur (Ceviz, Antep fıstığı) ya da çok küçüktür.

- Nektar salgılamazlar, stigmaları çok parçalı pürüzlü ve geniştir. Erkek organları büyük ve polen sayısı oldukça fazladır.



Hem böceklerle ve hem de rüzgarla tozlanabilen bitkilerden biri: Çilek






ÇİLEK

Hem böceklerle ve hem de rüzgarla tozlanabilen kivi bitkisi





Kİvİ



- Kendine tozlanma: Bir çiçeğin dişi organının aynı çeşide ait çiçek tozlarıyla tozlanmasına denir.
- Yabancı tozlanma: Bir çiçeğin aynı türe ait başka bir çeşidin çiçek tozlarıyla tozlanmasına denir.
- Bitkilerde erkek ve dişi organların (gametlerin) farklı zamanlarda olgunlaşmalarından dolayı yabancı tozlanma olma olasılığı yükselir:
- **Homogamy**: Erkek ve dişi organların aynı zamanda olgunlaşmasına denir.


- **Dichogamy**: Erkek ve dişi organların farklı zamanlarda olgunlaşmasına denir. İki çeşittir;

a.Protoandry: Erkek organların dişi organlardan **önce** olgunlaşmasıdır.

b.Protogeny: Erkek organların dişi organlardan **sonra** olgunlaşmasıdır.

- Protoandry ve Protogeny özelliğini gösteren bitkiler kendine tozlanamadığı için yabancı tozlanma gösterir. Bu özelliği gösteren Fındık, Ceviz ve Antep fıstığı gibi meyve türlerinden ürün elde etmek için esas çeşitle aynı zamanda çiçek açan çeşitler yetiştirilmelidir. Bu çeşitlere *tozlayıcı çeşit* denir.

MANOLYADA PROTOGENİ





- Tozlanma zamanı havanın uzun süre sisli ve durgun olduğu yıllarda fındık, ceviz, kestane gibi türlerde ürün almak zorlaşır. Çünkü çiçek tozları havada asılı kalarak tozlanma engellenir. Karadeniz Bölgesi'nde bu durumla sık karşılaşılır. İçi boş meyveler oluşur. Aynı durum Güneydoğu Anadolu'da Antep fıstıklarında da sıcak esen kuru rüzgarlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Stigma kuruyacağından, polenler kuru stigma üzerinde çimlenemez ve içi boş (fıs) meyveler oluşur.




TOZLAYICI ÇEŞİT SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Tozlayıcı çeşit bol çiçek tozu oluşturmalı ve bunların çimlenme oranı yüksek olmalı.
- Tozlayıcı çeşidin çiçek açma zamanı uzun ve ana çeşitle aynı dönemde olmalı.
- Tozlayıcı çeşit bağda önemli ölçüde yer kaplıyacağından bölge için ekonomik öneme sahip standart bir çeşit seçilmelidir.
- Tozlayıcı çeşit hermafrodit çiçek yapısına sahip olmalıdır.






Dişi gamet oluşumu (megasporogenesis)




Erkek gamet oluşumu (mikrosporogenesis)

DÖLLENME

- Erkek ve dişi gametlerin birleşmesine döllenme denir.






- Dişi organın stigması üzerine gelen polenler stigma salgısını absorbe ederek çimlenir. Polendeki porlardan polen tüpü gelişmeye başlar, polen tüpünün salgıladığı kütilaz enzimi ve stigmanın kütikul ile kaplı epidermis hücrelerini eriterek stil içine girer ve stil dokusu tarafından beslenir ve stil dokusunu eriterip ovaryuma ilerler.




Click on the image banner hereabove to start a small film by dr. I. Lichtscheidl cs on pollen tube growth and fertilization in plants.


Source: site of the department for Cell Physiology and Scientific Film of the university of Vienna)


- İki çekirdekli polenlerde vejetatif çekirdeğin arkasından polen tüpüne geçen generatif çekirdek bölünerek iki tane generatif çekirdek (gamet, sperm) oluşturur. Uç kısımdaki sitoplazma içinde vejetatif ve generatif çekirdekleri taşıyan polen tüpü uzayarak tohum taslağını ulaşır.
- Erkek gametlerden birinin yumurta hücresinin çekirdeği ile birleşmesi sonucu diploid yapıdaki (2X) zigot oluşur. Diğer gametin iki polar çekirdekle birleşmesi sonucu triploid (3X) endosperm çekirdeği oluşmasına **ÇİFT DÖLLENME** denir.






POLEN ÇİMLENMESİ








POLEN

Zambak bitkisinde olgun embriyo kesesi







Domateste polenlerin çimlenmesi ve dişicik borusu içinde polen tüpü gelişimi




Döllenme


Pollen grain
Sperm cells
Tube nucleus
Pollen tube
Sperm
Polar nuclei
Egg
Ovule walls
Embryo sac
Micropyle


stamen
anther
filament
anther
pollen grains
1
pollen tube
style
2
ovule
ovary
pistil
stigma
style
ovary
sepal
ovule
carpel
pedicel
endosperm
endosperm nucleus
polar nuclei
sperm
3
pollen tube
egg
micropyle
embryo sac
embryo
5
zygote
4
© 2006 Merriam-Webster, Inc.


Döllenme



A
Silk (stigma)
Stylar canal
Pollen tube
Embryo sac
B a
b
c
Female gametophyte
Female polar nuclei
Sperm nuclei
Egg nucleus
Pollen tube
Fertilization
Endosperm (3n)
Embryo
Nature Reviews | Genetics




Döllenme sonrasında embriyonun gelişimi









c Torpedo stage (186 ×).

DÖLLENMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

- Dişi organın stigmasının reseptif (döllenme olgunluğunda) halde olması,
- Polenin çimlenmesi,
- Polen tüpünün embriyo kesesine girecek kadar gelişmesi,
- Yumurta hücresinin canlı olması gerekir.
- Sıcaklık optimum seviyenin altında veya üzerinde ise polenlerin çimlenmesini polen tüpünü embriyo kesesine ulaşması ve dişi gametin canlı kalma süresini olumsuz etkiler.

- Bir çeşidin kendi çiçek tozlarıyla döllenmesine **kendine döllenme (autogamy)**; başka bir çeşidin ya da çeşitlerin çiçek tozlarıyla döllenmesine **yabancı döllenme (allogamy)** denir. Büyük çoğunlukla bahçe bitkileri yabancı döllenir.

Yabancı Döllenen meyve ve sebzeler		
Meyveler		**Sebzeler**
Elma	İncir	Havuç
Armut	Hurma	Kereviz
Kiraz	Avokado	Turp
Erik	Böğürtlen	Ispanak
Badem	Ahududu	Lahana
Ceviz	Çilek	Brokkoli
Pikan cevizi	Üzüm	Soğan
Zeytin	Karpuz	Kabak
Muz	Kuşkonmaz	Marul
Bamya		


KISIRLIK (STERILITY)


- Çiçeklerde erkek ve dişi gametlerin oluşum ve gelişmeleri her zaman, daha önce açıklandığı gibi normal olmamakta, kısırlık adı verilen bazı olumsuz gelişmeler de meydana gelmektedir.
- Kısırlık, eşey organlarındaki;
- a) morfolojik noksanlıklar veya yetersizlikler,
- b) genetik,
- c) sitoplazmik yapı nedeniyle, normal eşey hücrelerinin(gametlerin) oluşamaması, bu nedenle döllenme ve döllenme yeteneğinden veya her ikisinden birden yoksun kalma veya bazı bitkilerde embriyo ve endospermin gelişememesidir.

- Eşey organlarının yapısal (morfolojik) noksanlıkları veya yetersizlikleri nedeniyle oluşan kısırlıklara 'morfolojik kısırlık' denir. Bu yapı noksanlığı veya yetersizlikleri, dişi veya erkek gametlerden birinin veya her ikisinin birden oluşumunu ve gelişimini önleyebilmektedir.

Erkek Kısırlığı(Male Sterility)

- Genetik ve sitoplazmik nedenlerle oluşan başlıca kısırlık şekli erkek kısırlığıdır (male sterility).





Erkek Kısırlığı (Male Sterility)

- Erkek kısırlığı meydana geliş nedenlerine göre;
- a) genetik,
- b) sitoplazmik ve,
- c) sitoplazmik-genetik erkek kısırlığı olarak üç grupta toplamak mümkündür.

- J.H. Hale şeftali çeşidinde ve Washington Navel portakalında, çiçek tozu ana hücrelerindeki gelişmeler büyümenin belli bir döneminde durmakta, çiçek tozları oluşmamakta ve başçıklar esmer kahverengi bir görünüm almaktadır. Bu çeşitlerde döllenmiş tohum elde edilmek istendiği zaman başka bir tozlayıcı çeşit kullanmak zorunluluğu vardır.

Erkek Kısırlığı (Male Sterility)

- Erkek kısırlığı daha çok domates, fasulye ve soğanlarda görülmektedir. F1 hibrit çeşitlerin üretiminde ana ebeveynlerdeki emaskülasyon işleminin ortadan kalkması açısından yararlanılan bir özelliktir.



Domates bitkisinin çiçeği



Soğan bitkisinin çiçeği

EŞEY UYUŞMAZLIKLARI

Meyve, sebze ve süs bitkilerinin büyük bir kısmı meyve verebilmek için tohum oluşumuna gerek duyarlar.

Apomiktik bazı türler dışında, tohum oluşumunu ilk koşul, eşey organ ve hücrelerinin normal gelişmesidir.

Ancak gamet hücrelerinin ve tozlanma olayının normal oluşumuna karşın, bazı genetik nedenlerle döllenmenin gerçekleşmediği ve tohumun oluşamadığı da görülmektedir.

Eşey organları ve gametleri normal yapıda oldukları ve yaşama gücünde döllenmiş tohum oluşturabilme yeteneğinde bulundukları halde, genetik yapı nedeniyle, çiçek tozu ile dişicik borusu (veya bazı hallerde dişicik tepesi) arasındaki karşılıklı etkileşme sonucu, çiçek tozlarının çimlenmesinin veya tozu borularının dişicik borusu içindeki gelişmelerinin engellenmesine ‘eşeysel uyuşmazlık’ denir.

- Bir bitkinin çiçek tozları kendi dişi çiçeklerinin veya aynı çeşide ait diğer bitkilerin dişi çiçeklerini dölleyemiyorsa buna **kendiyle uyuşmazlık (self-incompatibility)** denir.

- Bir çeşidin çiçek tozlrı aynı tür içindeki diğer bir çeşidi dölleyemiyorsa buna **karşılıklı uyuşmazlık (cross-incompatibility)** denir.